

Программа калькулятор **Cutoff** <http://crsv.izmiran.ru/cutoff> вычисляет жёсткость геомагнитного обрезания для заданной даты (1900-2015, экстраполяция до 2050) и в заданной географической точке. С заданной высоты под определенным зенитным и азимутальным углом выпускаются антипротоны различной жёсткости, и прослеживается их траектории. Если частица вышла из магнитосферы - жёсткость разрешённая, если вернулась на землю или крутится слишком долго (продолжительность полёта задаётся) - жёсткость запрещённая. Программа может считать траектории в одной из заданных моделей магнитосферы: диполь, IGRF, модели Цыганенко IGRF+T89, IGRF+T96, IGRF+T02.

Результат программы – нижнее, верхнее и эффективное значение жесткости геомагнитного обрезания и пенумбра, например, для модели IGRF выглядит как:

Cutoff rigidities: lower 1.765 upper 2.416 effective 2.185



Тестовая проверки калькулятора.

Для проверки калькулятора можно для тестовых значений параметров модели получить тестовые значения результатов исходя из следующей таблицы.

For 01.07.2017 00:00:00 and Geographic (latitude, longitude) - (55.00, 40.00)

Vertical angle - 0.00 and Azimutal angle - 0.00

Model	Parametrs					Result			Calcul ation time, sec
						Cutoff rigidities, GV			
	Kp	P _{sw} (nPa), Solar wind dynamic pressure	D _{st} - index (nT)	IMF B _y and IMF B _z , nT	G ₁ and G ₂	lower	upper	effective	
Dipole						2.337	2.737	2.498	6
IGRF						1.765	2.416	2.185	37
IGRF+T89	4					1.582	2.190	1.922	28
IGRF+T96		2	-50.0	0 and 5		1.518	2.156	1.906	1188
IGRF+T02		2	-50.0	0 and 5	6 and 10	1.649	2.234	1.947	3964

rigidity lower and upper limit (GV): 0.0 – 3.0

step 0.001 GV, Maximum time of flight - 180.00 s.

Памятка.

- 1) После выбора модели калькулятор предлагает задать обязательный набор параметров.
- 2) Чем старше модель Цыганенко, тем более модель времязатратна. Особенно это касается моделей T96 и T02. Для ускорения времени счета рекомендуется более внимательно выбирать значения rigidity lower and upper limit. Так при выборе Rmin=0 и Rmax=3 GV время счета для модели IGRF+T02 равно 3964 сек, при уточнении этого диапазона Rmin=1.3 и Rmax=2.6 GV время счета для модели уже 1200 сек. При необходимости применения старших моделей Цыганенко (T96 и T02) рекомендуется по модели IGRF оценить Rmin и Rmax и эти значения использовать в дальнейшем.
- 3) Шаг интегрирования выбран высокий - 0.001 GV. Обычно ограничиваются шагом интегрирования 0.01 GV или меньше, что позволяет ускорить работу калькулятора на порядок. Для модели IGRF+T02 при шаге 0.01 GV время счета вместо 1200 сек менее 2 минут.

4) Параметры магнитосферы K_p , D_{st} и параметры межпланетной среды P_{sw} , D_{st} , IMF B_y , IMF B_z определяются экспериментально, а параметры G_1 , G_2 и G_3 по алгоритму, изложенному в Description_CutOff.doc в <ftp://crsb.izmiran.ru/MagEffect> (See guide.pdf).

Другие калькуляторы вычисления жесткостей геомагнитного обрезания.

1) Zreda Marek. COSMOS project University of Arizona. Cutoff rigidity online Calculator, model IGRF. E-pub. 2012. <http://cosmos.hwr.arizona.edu/Util/rigidity.php>. Онлайн Интернет проект базируется только на модели IGRF и рассматриваются только вертикально падающие частицы.

2) Boschini M.J., Della T.S., Gervasi M., Grandi D., Rancoita P. G., Bobik P., Kudela K. // Cutoff rigidity online Calculator, model T96, T05. E-pub. 2014. <http://www.geomagsphere.org>. Онлайн Интернет проект базируется только на более сложных моделях магнитосферы (Цыганенко T96 и T05) с автоматическим привлечением необходимых входных для модели магнитосферы параметров межпланетной среды, что является очень полезной опцией.

Литература.

- 1) Gvozdevsky Boris, Dorman Lev, Abunin Artem, Preobrazhensky Maxim, Gushchina Raisa, Belov Anatoly, Eroshenko Evgeniya, Yanke Victor, "Variations of the vertical cut off rigidities for the world wide neutron monitor network over the period of continues monitoring of cosmic rays", Proc. 34th ICRC, Hague, [PoS203](#).  [pdf](#)
- 2) Гвоздевский Б.Б., Абуни А.А., Преображенский М.С., Гущина Р.Т., Белов А.В., Ерошенко Е.А., Янке В.Г. "Магнитосферные эффекты космических лучей. I. Долгопериодные изменения жесткостей геомагнитного обрезания мировой сети нейтронных мониторов", Геомагнетизм и Аэронавтика, Т.56, No 4, pp. 411–422, 2016. [doi: 10.7868/S0016794016040040](#). // В. В. Gvozdevskii, A. A. Abunin, P. G. Kobelev, R. T. Gushchina, A. V. Belov, E. A. Eroshenko, and V. G. Yanke Magnetospheric Effects of Cosmic Rays. I. Long-Term Changes in the Geomagnetic Cutoff Rigidities for the Stations of the Global Network of Neutron Monitors ISSN 0016-7932, Geomagnetism and Aeronomy, 2016, Vol. 56, No. 4, pp. 381–392. © Pleiades Publishing, Ltd., 2016. [doi:10.1134/S0016793216040046](#).
- 3) Гвоздевский Б.Б., Белов А.В., Гущина Р.Т., Ерошенко Е.А., Кобелев П.Г., Янке В.Г. Долгопериодные изменения вертикальных жесткостей геомагнитного обрезания за весь период мониторинга космических лучей // "Physics of Auroral Phenomena" Proc. XL Annual Seminar, Apatity, pp. 89-93, 2017  [pdf](#)
- 4) Gvozdevsky B., Belov A., Gushchina R., Eroshenko E., Preobrazhensky M., Yanke V. The secular variations of cosmic ray cutoff rigidities, caused by century variations in geomagnetic field, and cosmic ray variations // Proc. 35th ICRC, Korea, PoS067, 2017  [pdf](#)
- 5) Гвоздевский Б.Б., Белов А.В., Гущина Р.Т., Ерошенко Е.А., Кобелев П.Г., Янке В.Г. Долгопериодные изменения вертикальных жесткостей геомагнитного обрезания космических лучей // Ядерная физика и инжиниринг. Т.8, No 4, p.1-9. 2017. [doi: 10.1134/S2079562917040133](#).  [pdf](#)